Conduite à tenir en cas de diarrhée chez un résident

CRAtb
Centre Régional en Antibiothérapie de Bretagne

CPias Bretagne

Résident présentant une diarrhée
Hors immunodépression

Sans signes infectieux (absence de fièvre) Et sans gravité
→ Recherche d'une cause non infectieuse
→ **PAS D'ANTIBIOTIQUES**
Traitement symptomatique
(réhydratation, antalgique)

Exposition récente aux antibiotiques et/ou cas d'ICD dans l'unité
→ Suspicion d'infection à *Clostridioides difficile*
→ **CF fiche spécifique**

Avec signes infectieux et/ou signes de gravité (sang, pus, fièvre >39°C)
→ Coproculture pour identification du pathogène

Négatif
→ Probablement viral (*rotavirus, adénovirus, norovirus…*)
→ PCR éventuelle d'identification
→ **PAS D'ANTIBIOTIQUES**
Traitement symptomatique
(réhydratation, antalgique)

Positif (identification d'une bactérie)
→ **Traitement antibiotique adapté à la bactérie identifiée**
(en complément du traitement symptomatique)
→ **Antibiogramme**
→ **Réévaluation du traitement** (72h)

IMPORTANT
- **En l'absence d'étiologie, les anti-péristaltiques de type Lopéramide sont contre-indiqués.**
- **Application des PCC**
- **Dès la suspicion d'ICD: PC *Clostridioides***

ICD : Infection à *Clostridioides difficile*
PC : Précautions Complémentaires
PCC : Précautions Complémentaires Contact

Sources : *Guide de bon usage du médicament en gériatrie* (ARS Lorraine), *Guide des recommandations de prise en charge des infections aiguës en EHPAD*, *Le bon usage des antibiotiques en EHPAD* (omedit Ile de France, 2018), Vidal recos 2021, *Diarrhée aiguë chez l'enfant et chez l'adulte* (E. PILLY 2020)